OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

72,896

MÉLANGES
EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

TRENTE-TROISIÈME FASCICULE

(12 mai 1921)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS

MOULINS
" LES IMPRIMERIES RÉUNIES "
15, RUE D'ENGHIEN, 15

—

1921

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

NOUVEAUTÉS DIVERSES[1]

Cryptocephalus Maindroni (Jac.). Elongatus, nitidus, rufus, pygidio, abdomine pectoreque pro parte nigris, elytris nigro 4 maculatis (2,2), antice nigro marginatis, thorace postice nigro marginato. Long. 8 mill. Indes: Mahé. — A placer près de *6-signatus* F.

C. (2) **bengalensis** n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, capite postice, infra corpore pygidioque pro parte nigris, thorace in disco nigro bilineato, elytris nigris, testaceo 4 notatis (1,2,1). Long. 5 mill. Bengale. — Voisin de *exsulans* Sufr., prothorax à dessins noirs différents, élytres à macule apicale large, très échancrée en avant.

C. Gallienii n. sp. Brevis, postice attenuatus, infra pro majore parte testaceus, supra æneo-viridescens, elytris cyanescentibus, labro, antennis pedibusque testaceis. Long. 4-5 mill. Madagascar. — A placer près de *metallescens* Frm.

C. minutissimus n. sp. Minutus, parum nitidus, postice valde attenuatus, pallido-testaceus, oculis nigris; elytris sat fortiter lineato-punctatis, lateraliter sub-

(1) Les nouveautés décrites sans indications spéciales sont de ma collection. Dans ce fascicule diverses espèces me viennent des récoltes de M. Corporaal, de Sumatra.

(2) Pour simplifier l'impression, je désigne seulement par la première lettre du genre, les espèces du même genre qui suivent celle décrite la première.

striatis. Long. 2 mill. Obock. — Voisin de *melanocephalus* Suf., plus rétréci postérieurement et élytres à ponctuation plus rapprochée.

C. Favareli n. sp. Robustus, satis brevis, testaceus, scutello, infra corpore pro parte pedibusque pro majore parte nigris, elytris nigro-cœruleis, thorace in disco et lateraliter nigro-maculatis. Long. 5 mill. Ogoué. — A placer près de *dislocatus* Suf.

C. binotatithorax n. sp. Parum elongatus, nitidus, testaceus, infra corpore pro parte nigro, argenteo pubescente, thorace in disco et lateraliter nigro maculato. Long. 5-6 mill. Congo. — Prothorax maculé comme le précédent, mais forme plus allongée et élytres testacés.

C. Bingeri n. sp. Satis brevis, postice attenuatus, supra testaceus, nigro notatus, infra niger, pygidio testaceo marginato, antennis, scutello et pedibusque pro majore parte testaceis. Long. 3 mill. Congo. La tête a une macule noire et le prothorax 2 macules grandes et rapprochées, les élytres ont une fascie basale, et une autre postmédiane droites noires. — Voisin de *subcyaneonotatus* Pic.

Crioceris Guerryi n. sp. Satis robustus, testaceus, elytris ad basin sparse et mediocre punctatis. Long. 8 mill. Yunnan. — A placer près de *subpolita* Mots.

C. rufimembris n. sp. Parum robustus, rufus, infra corpore pro parte nigro. Long. 7 mill. Yunnan. — Voisin du précédent, moins large et plus pâle.

C. subcostata n. sp. Parum elongatus, rufus, infra corpore pro parte nigro, elytris punctatis, postice et lateraliter subcostatis. Long. 9 mill. Chine. — Plus

grand que le précédent avec la sculpture élytrale différente.

C. foveolata n. sp. Robustus, supra rufo-testaceus, pro parte brunneo tinctus, infra late niger, pedibus rufis, femoribus pro parte piceis, elytris ad medium et lateraliter piceo maculatis, his antice gibbosis, irregulariter foveolatis. Long. 9-10 mill. Cochinchine. — Voisin de *dromedaria* Baly.

Mimolema n. gen. Antennis brevibus, apice dilatatis; capite ad oculos longe impresso-sulcato, oculis parum prominulis; thorace breve, postice marginato; unguibus fissis; coxis anticis approximatis. Genre voisin de *Lema* F. et caractérisé par la structure de sa tête et ses antennes non filiformes.

Mimolema bicoloricornis n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, antennis ad medium, thorace supra late, femoribus pro parte, scutello, elytris, his lateraliter vage rufo marginatis, et infra corpore pro majore parte piceo-æneis; thorace minute, sat dense punctato, postice breve sulcato; elytris lineato-punctatis. Long. 4 mill. Zanzibar.

Lema diversipes n. sp. Parum elongatus, testaceus, infra corpore et pedibus 4 posticis nigris; thorace satis breve, postice transverse sulcato; elytris lineato-punctatis, postice costulatis. Long. 8 mill. Yunnan. — Peut se placer près de *Mouhoti* Baly.

L. bicoloriceps n. sp. Oblongus, niger, elytris cyaneis, capite postice, thorace abdomineque apice flavis. Long. 8 mill. Gabon. — Voisin de *erycina* Baly.

L. brevenotata n. sp. Oblongus, niger, antennis ad basin, thorace, pedibus abdomineque testaceis, elytris

viridi-metallicis, ad basin et apice breve testaceo notatis. Long. 3,5 mill. Congo. — Voisin de *flavipes* Suf.

L. rufoannulata n. sp. (1). Oblongus, minutus, niger, abdomine pro parte femoribusque posticis ad medium rufis, supra viridi-metallicus, vertice minute rufo bimaculato. Long. 5 mill. Gabon. — Voisin de *rufonotaticeps* Pic.

Ocladius diversesulcatus n. sp. Subovatus, niger, vage rufo notatus, thorace ad medium fortiter et profonde bisulcato, lateraliter breve sulcato aut foveolato; elytris sparse et mediocre punctatis aut tuberculatis, tuberculis apice foveolatis. Long. 5 mill. Madagascar. — Espèce très distincte par sa structure élytrale et thoracique.

O. diversesculptus n. sp. Subovatus, nitidus, niger, antennis rufis, thorace elytrisque pro parte et diverse foveolatis aut impressis, pro parte et irregulariter alte plicatis aut tuberculatis. Long. 4,5 mill. Diego-Suarez. — Voisin de *Alluaudi* Frm.

Nanophyes robustus n. sp. Subovatus, luteo pubescens, pro parte denudatus, rufus, thorace, elytris ad scutellum et lateraliter nigro notatis; rostro elongato, apice nigro; antennis apice fuscis; thorace antice fortiter attenuato, medio luteo lineato; elytris satis brevibus, striatis; pedibus validis, femoribus anticis multi dentatis. Long. 4 mill. Java. — Espèce remarquable par son aspect robuste, ses grosses pattes et les macules foncées bien distinctes du dessus du corps.

Chelonarium luteopilosum n. sp. Oblongo-ovatus, rufescens, supra luteo pubescens, pro parte et diverse

(1) Le *Lema rufiventris mihi*, de même origine et à abdomen roux, est un peu plus grand et moins large, noir, cuisses comprises, avec les élytres un peu bleutés.

albo pubescens. Long. 5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Peut se placer près de *irroratum* Reitt.

Scutotoxidium atripenne n. sp. Oblongus, niger, capite antice, thorace vage, antennis, pedibus, pygidio abdomineque pro parte rufis; elytris fortiter et sparse punctatis, ad suturam sulcatis. Long. 3 mill. Sumatra.

Scaphidium subdepressum n. sp. Ovatus, satis depressus, testaceus, antennis apice nigris, thorace postice breve et elytris antice et medio late nigro notatis, scutello nigro; thorace minute, elytris fortiter et sat dense punctatis. Long. 3 mill. Sumatra. — Sans doute voisin de *plagiatum* Ach.

S. rufofemoratum n. sp. Oblongus, rufus, antennis apice tibiisque nigris; thorace elytrisque minute et sparse punctatis. Long. 4 mill. Sumatra. — Voisin de *sondaicum* Gestro, moins allongé avec les fémurs roux.

Scaphosoma rufomaculatum n. sp. Subovatus, niger, capite antice, antennis, pedibus abdomineque apice testaceis, elytris nigris, apice testaceis, in disco rufomaculatis, his latis et brevibus, sparse punctatis, stria suturalis antice non producta. Long. 2 mill. Sumatra. — Plus trapu que *luteomaculatum* Pic, avec les élytres ornés d'une macule discale rousse.

Conocnemis laterufus n. sp. Minutus, oblongus, fere glaber, rufus, supra in disco pro parte brunnescens, thorace parum elongato, lateraliter minute crenulato; elytris parum latis, costatis, intervallis sat profunde punctatis. Long. 3 mill. Sumatra. — Voisin de *sumatrensis* Pic, avec les élytres plus nettement ponctués.

Hylophilus junctofasciatus n. sp. Oblongus, rufescens, antennis et pedibus posticis pro parte nigris, elytris transverse nigro bifasciatis, fasciis in disco junctis. Long. 3 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Espèce très distincte par ses dessins élytraux particuliers et la structure des membres du ♂ qui a les tibias intermédiaires très coudés, puis échancrés et dentés en dedans.

H. Corporaali n. sp. Oblongus, rufescens, antennis et pedibus pro majore parte, elytris abdomineque pro parte nigris. Long. 3 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Voisin de *diversipes* Pic, distinct, à première vue, par la tête rousse, les pattes ordinaires avec les cuisses postérieures simplement épaissies.

H. testaceohumeralis n. sp. Oblongo-elongatus, niger, capite thoraceque rufis, elytris nigris, ad humeros testaceo-maculatis, pedibus 4 anticis pro majore parte testaceis, posticis nigris, femoribus ad basin rufis. Long. 3 mill. Sumatra. — Voisin de *Theresæ* Pic, plus allongé, avec les élytres seulement maculés vers les épaules.

Hylophilus rubrobasalis n. sp. Oblongus, niger, antennis, femoribus ad basin, geniculis posticis, tarsis et pectore rubro-testaceis, elytris nigris, ad basin sat late rubro-testaceis. Long. 2 mill. Sumatra. — Voisin de *javanus* Pic.

Hylobaenus fasciatus v. nov. subobliteratus. Elytris griseo pubescentibus, postice nigro fasciatis et antice ad scutellum et ad humeros nigro maculatis. Sumatra.

Leichrodomorphus n. gen. Corpus convexus; capite antice in mare bicornuto; antennis satis validis; tho-

race breve, antice lunato, lateraliter valde marginato; elytris lateraliter marginatis. Genre paraissant voisin de (1) *Derispia* Lewis et établi pour les espèces nouvelles suivantes.

L. brevicornis. Rufus, antennis nigris, ad basin testaceis, supra niger, thorace lateraliter testaceo, elytris late testaceo binotatis; capite breve cornuto ♂. L. 1,5 m. Ile Nias. — **L. longicornis.** Rufus, antennis nigris, ad basin testaceis, elytris nigris, late luteo binotatis. L. 2 m. Sumatra. — **L. latifrons.** Rufus aut testaceus, lateraliter aliquot vage brunnescens; capite in mare longe cornuto. L. 2 m. Kina Balu. — **L. gibbosus.** Rufo-testaceus, elytris lateraliter ad medium et postice piceo notatis, his gibbosis. L. 2 m. Bornéo. — **L. rufescens.** Rufescens, antennis pedibusque pallidioribus, elytris non gibbosis. L. 2 m. Sumatra. — **L. suturifer.** Rufescens, antennis apice nigris, elytris ad suturam nigro lineatis. L. 1,5 m. Java. — **L. fasciatus.** Rufus, antennis late nigris, elytris piceis, ante et post medium rufo maculatis aut fasciatis. L. 2 m. Java. — **L. laticornis.** Testaceus, antennis apice nigris, elytris ad suturam, lateraliter ad medium et postice nigro notatis; capite in mare late et sat longe cornuto. L. 1,5 mill. Banguey.

Leichrodes 6 maculatus n. sp. Rufescens, thorace in disco nigro, elytris nigris, pro parte rufo marginatis, in disco singulo luteo trinotatis. Long. 3-4 mill. Tonkin.

---

(1) Il se pourrait que *Leichrodomorphus* ne soit qu'un sous-genre de *Derispia* Lewis, qui ne m'est connu que par la description.

(2) Je donne des diagnoses abrégées pour ces diverses nouveautés, dont je parlerai ultérieurement, dans une étude d'ensemble que j'ai l'intention d'entreprendre sur le groupe des *Leiochrinæ* et formes affines comme le genre *Derispia* Lewis, et je sollicite, pour mettre ce projet à exécution, la communication indispensable d'insectes de divers genres connus et principalement celle des types.

L. annamitus n. sp. Niger, pro parte rufo marginatus, antennis rufis, elytris in disco breve rufo bimaculatis. Long. 2 mill. Annam.

L. trijunctus n. sp. Testaceus, elytris ad suturam et in disco lateraliter piceo lineatis ,lineis antice et postice junctis, ad medium piceo fasciatis. Long. 2 mill. Annam.

L. piceipennis n. sp. Rufus, elytris piceis, pro parte et parum distincte rufo marginatis. Long. 3 mill. Madagascar.

L. subovatus n. sp. Subovatus et latus, parum convexus, uniformiter testaceus. Long. 2 mill. Philippines.

L. nigromaculatus n. sp. Rufus, elytris nigro marginatis et nigro 5 maculatis, postice ad suturam longe nigro lineatis. Long. 4 mill. Malabar.

Zophobas arcuatipes n. sp. ♂ Oblongus, robustus, opacus, antennis pedibusque pro parte rufescentibus, elytris sat late et transverse rufo-bifasciatis; antennis elongatis; epistome inciso; thorace lato, subdepresso, indistincte punctato; elytris substriatis et fortiter punctatis; pedibus elongatis, parum punctatis, tibiis anticis et intermediis arcuatis. Long. 13 mill. Brésil. — A placer près de *Z. 4-maculatus* Ol.

Z. minutus n. sp. ♂. Elongatus, opacus, niger, antennis pedibusque satis brevibus, tibiis anticis et intermediis arcuatis; epistome mediocre inciso; thorace subquadrato, fere impunctato; elytris substriatis et mediocre punctatis. Long. 16 mill. Brésil. — A placer près de *Kirschi* Kr.

Z. diversipes n. sp. ♂. Elongatus, opacus, rufescens; antennis satis elongatis; epistome late et parum

profunde emarginato; pedibus elongatis, pro parte et sparse granulatis, tibiis anticis et intermediis arcuatis; thorace parum breve; elytris striatis et mediocre punctatis. Long. 18 mill. Guatemala. — A placer près de *rugipes* Kirsh.

Z. rugipes v. nov. diversicolor ♂. Elongatus, subopacus, piceus, pro parte rufescens; epistome late et parum profunde emarginato; thorace lateraliter subarcuato. Long. 21 mill. Honduras. — Diffère du précédent par le prothorax moins aplati et nettement subarrondi en avant, la ponctuation plus large des élytres, l'échancrure de l'épistome plus régulière, etc.

Z. rufotinctus n. sp. ♂. Oblongus, postice valde attenuatus, opacus, piceus, pro parte rufescens; antennis brevibus; epistome fortiter emarginato; thorace lato, in disco sparse et mediocre punctato; elytris substriatis et minute punctatis; pedibus parum elongatis, tibiis anticis et intermediis arcuatis. Long. 20 mill. Pérou. — A placer près de *laticollis* Mots.

La var. *boliviensis* mihi (1 ♀ de Bolivie) a les élytres un peu bombés et présente une coloration plus foncée avec le prothorax marqué de roux de chaque côté; la ponctuation élytrale est plus forte et l'épistome est tronqué, tandis que les tibias sont plus arqués.

Z. elongatior n. sp. Elongatus, opacus, niger, antennis satis brevibus; epistome truncato; thorace parum breve; elytris elongatis, postice attenuatis, striatis et mediocre punctatis; pedibus elongatis, tibiis anticis sinuatis et curvatis, intermediis subcurvatis. Long. 28 mill. Venézuéla. — Espèce très distincte par sa forme allongée jointe à la structure de ses pattes antérieures.

Z. atricolor n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, sed satis latus, niger, subnitidus; epistome sat fortiter inciso et

sinuato; antennis brevibus; thorace transverso; elytris fere instriatis et mediocre punctatis; pedibus satis brevibus, tibiis anticis et posticis arcuatis. Long. 25 mill. Equateur. — A placer près de *tridentatus* Kr.

Z. costatus n. sp. ♀. Elongatus, niger, subnitidus; antennis pedibusque brevibus, tibiis anticis parum arcuatis; epistome truncato; elytris fortiter striato-punctatis, intervallis elevatis. Long. 18 mill. St-Dominique. — A placer près de *morio* F. et très distinct par ses intervalles surélevés.

Osphia nigroapicalis n. sp. Elongatus, rufo-testaceus, infra corpore pro majore parte, tarsis elytrisque apice breve nigris. Long. 8 mill. Indes. — Voisin de *melina* Chp.

Eurypinus elongatus n. sp. Elongatus, parum nitidus, rufescens, pro parte brunneo notatus, antennis tarsisque nigris, elytris brunneis, pro parte rufo cinctis. Long. 6 mill. Afrique Australe. — Plus allongé que *Nyasæ* Chp. et autrement coloré.

Physiomorphus rufotinctus n. sp. Niger, thorace lateraliter rufo-notato, femoribus pro parte rufis. Long. 7 mill. Brésil. — Diffère de *atricolor* Pic, par les élytres plus larges, le prothorax en partie roux, etc.

Pogonoceromorphus n. gen. Capite collo longe munito, oculis validis, approximatis ; antennis gracilibus, articulo 3° et sequentibus longe flabellatis; thorace elongato, antice strangulato, postice sulcato. — Ce genre, voisin de *Pogonocerus* Fisch., s'en distingue, à première vue, par la structure de son prothorax et le 3e article des antennes long et mince.

Pogonoceromorphus gracilis n. sp. Angustatus, nitidus, testaceus, oculis, antennis tarsisque nigris, tho-

race nigro, supra late rufo, elytris rufis, lateraliter et postice nigris. Long. 8 mill. Guyane: Maroni.

Pseudopyrochroa opacicollis n. sp. ♀. Elongatus, opacus, niger, capite pro majore parte, thorace, scutello elytrisque ad basin late rubris; antennis validis; thorace dense punctato, multi impresso, lateraliter subsinuato. Long. 15 mill. Sumatra. — Voisin de *sulcaticeps* Pic.

Selasia Auberti n. sp. Minutus, oblongus, nitidus, testaceus, elytris postice late nigris; articulo 3° antennarum triangulare. Long. 5 mill. Sénégal. — Ressemble à *basipennis* Pic, mais prothorax plus droit sur les côtés, macule basale des élytres moins étendue et prolongée un peu sur la suture, taille petite.

S. Raffrayi n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, elytris in disco et postice vage brunnescentibus, abdomine pro parte nigro; articulo 3° antennarum triangulare. Long. 8 mill. Abyssinie. — A placer près de *Robecchii* Gestro.

Ceylanidrilus atripennis. Modice elongatus, niger, capite, thorace, scutello coxisque testaceis. Long. 4,5 mill. Indes orientales.

C. nigriceps n. sp. Elongatus, niger, thorace pro parte femoribusque rufo tinctis, elytris luteis, apice late nigris. Long. 4 mill. Ceylan.

Eugesis lineatus n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, antennis nigris, elytris ad suturam et lateraliter nigro lineatis. Long. 7 mill. Indes. — Voisin de *nigripennis* Pasc.

Stenocladius basalis n. sp. Oblongus, testaceus, capite, antennis, abdomine elytrisque nigris, his ad

basin minute testaceis, tibiis pro parte brunneis, antennis longe flabellatis. Long. 6 mill. Ceylan. — Voisin de *Fairmairei* Brg.

Dodecatoma fuscicornis v. nov. testaceicornis. Testaceus, capite elytrisque nigris. Java.

Diplocadum Hasselti v. nov. testaceum. Testaceus, capite pro parte brunnescente. Sumatra.

Bicladum n. gen. Antennis biflabellatis. Caractères généraux et faciès de *Diplocadum* Gorh., avec les antennes de structure particulière.

Bicladum multipunctatum n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, capite elytrisque nigris, his fortiter et dense punctatis, subcostulatis, antennis biflabellatis. Long. 7 mill. Bornéo. — Très distinct par sa forte ponctuation élytrale et ses antennes biflabellées.

Monodrilus n. gen. Antennis brevibus, simplicibus, apice attenuatis, pro parte impressis; thorace semicirculare, angulis posticis prominulis; elytris marginatis, dehiscentibus. — Genre voisin de *Diplocadum* Gorh., à structure des antennes simple.

Monodrilus marginatus n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, capite elytrisque nigris, antennis tibiisque pro parte brunnescentibus; thorace granulato; elytris costulatis. Long. 7 mill. Java.

Pachytarsus longicornis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, testaceus, capite brunnescente, antennis, pedibus pro parte abdomineque piceis, elytris piceis, antice ad suturam et lateraliter testaceo marginatis ; antennis elongatis, dentatis; thorace transverso. Long. 5 mill. Sumatra.

Curtodrilus n. gen. Capite robusto; thorace breve et transverso, postice marginato; antennis dentatis; pedibus elongatis, parum compressis; elytris costatis. Ce nouveau genre peut se placer près de *Drilonius* Ksw.

Curtodrilus costatus n. sp. Oblongus, niger, thorace pro parte, pedibus pro parte elytrisque testaceis, his apice nigro notatis. Long. 5 mill. Sumatra.

Ototretadrilus n. gen. Antennis depressis, pro parte excavatis; thorace semicirculare, parum marginato, ad angulos posticos impresso; elytris postice attenuatis; pedibus paulo compressis. — Voisin de *Baolacus* Pic.

Ototretadrilus atritarsis n. sp. Opacus, testaceus, antennis, tarsis et elytris postice late nigris. Long. 6 mill. Indes: Malabar.

O. notaticollis n. sp. Minutus, robustus, niger, thorace testaceo, in disco piceo notato, scutello rufo limbato; antennis validis. Long. 4 mill. Indes Or.

Platerodrilus n. gen. Antennis pilosis, subfiliformibus, apice attenuatis, articulis 2 et 3 brevibus; thorace semicirculare, pro parte excavato; elytris depressis, costulatis; pedibus sat elongatis, paulo depressis. — Ce nouveau genre a un faciès de *Plateros* Brg., mais serait plutôt à classer dans les Drilides par les hanches rapprochées et l'articulation oblique des fémurs avec les trochanters.

Platerodrilus sinuatus n. sp. Satis elongatus, niger, pro parte rufescens, elytris ad humeros rufomaculatis, sinuatis, multi costulatis. Long. 7 mill. Malacca.

P. testaceicollis n. sp. Elongatus, nigro-piceus, pro parte rufescens, thorace elytrisque ad basin testaceis. Long. 7 mill. Sumatra.

P. Corporaali n. sp. Elongatus, nigro-piceus, pro parte rufescens, capite, thorace elytrisque ad basin late testaceis. Long. 7 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic).

P. angustatus n. sp. Angustatus et elongatus, opacus, niger, elytris ad basin sat late testaceis. Long. 9 mill. Sumatra (coll. Corporaal). — Plus allongé que le précédent, avec le prothorax moins arqué en avant, opaque, etc.

P. major n. sp. Elongatus, niger, capite, thorace elytrisque ad basin late testaceis; thorace transverso, breve. Long. 12 mill. Sumatra.

Libnetis opacus n. sp. Elongatus, opacus, nigro-piceus, femoribus ad basin testaceis. Long. 4 mill. Formose. — A placer près de *Kannegieteri* Pic.

L. testaceus n. sp. Parum elongatus, testaceus, capite postice, antennis pedibusque pro majore parte et infra corpore nigris. Long. 5 mill. Indes. — Voisin de *sumatrensis* Pic.

L. Corporaali n. sp. Angustatus, parum nitidus, nigro-piceus, thorace lateraliter pro parte testaceo, elytris testaceis, apice oblique nigro notatis. Long. 5-5,5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Voisin de *sejunctus* Brg., mais macule apicale obliquement coupée en avant et remontant sur la suture.

Dilophotes apicalis v. nov. lateniger. Elytris postice late nigris. Sumatra (coll. Corporaal et Pic).

D. notatipennis n. sp. Elongatus, niger, pro parte luteo pubescens, antennis ad basin pedibusque rufo notatis, elytris nigris, ad basin late rubro notatis, costa externa antice brunnescente. Long. 8 mill. Java. — Voisin de *rufonotatus* Pic.

D. discoidalis n. sp. Elongatus et angustatus, niger, elytris antice ad suturam longe testaceo notatis. Long. 5 mill. Bornéo. Très distinct par sa coloration.

D. sulcaticeps n. sp. Elongatus, niger, pro parte et vage piceo tinctus, capite sulcato, antennis depressis. Long. 5 mill. Palembeng. — Voisin de *Schelfordi* Brg.

D. Corporaali n. sp. Elongatus, nigro-piceus, membris pro parte testaceo notatis, capite antice, thorace elytrisque testaceis, his apice late nigro notatis; antennis depressis, longissimis. Long. 7-8 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Voisin du précédent avec les antennes plus longues, la coloration différente, etc.

D. depressicornis (nov.). Elongatus, nigro-piceus, antennis ad basin, coxis et femoribus ad basin testaceis, elytris nigris, antice testaceo lineatis. Long. 7 mill. Sumatra (coll. Corporaal). — Sans doute var. du précédent.

Ototreta atriceps n. sp. Elongatus, nitidus, niger, femoribus pro parte rufis, thorace rufo-testaceo, in disco nigro notato, elytris testaceis, apice sat longe, nigro notatis, incostatis, sat fortiter et dense punctatis. Long. 5 mill. Sumatra. — Par sa coloration ressemble à *Weterstradti* mihi, de l'île Banguey, plus allongé, prothorax moins transversal, tête et pattes plus foncées.

O. albicornis v. lateobscura. Nigro-piceus, pro parte brunnescens, pedibus aliquot pro parte rufescentibus, antennis apice pallidis. Bornéo.

O. costulata n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite, thorace, femoribus et infra corpore testaceis; antennis validis; thorace breve, sparse punctato; elytris punctato-rugulosis, costulatis. Long. 5 mill. Palembeng. — Voisin de *subtilis* Ol., prothorax peu ponctué, élytres nettement costés, etc.

O. testaceicollis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, pro parte piceus, thorace femoribusque testaceis; antennis parum validis; thorace breve, fere impunctato; elytris dense rugulosis, incostatis. Long. 4,5 mill. Ile Banguey. — Moins allongé que le précédent, élytres non costés, prothorax différent.

O. subtilis v. nov. femoralis. Elytris nigris, thorace mediocre, sat dense punctato, pedibus nigris, femoribus testaceis. Sumatra (coll. Corporaal et Pic).

O. lusoria v. nov. testaceonotata. Elytris nigris, ad humeros testaceo notatis. Sumatra (coll. Corporaal et Pic).

O. pectoralis (nov.). Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, capite pro parte, thorace, articulis 2 basilibus antennarum, thorace, scutello femoribusque rufo-testaceis aut testaceis, elytris testaceis, apice longitudinaliter sat longe piceo notatis, his incostulatis; antennis parum validis; thorace breve, antice subarcuato et marginato, mediocre et sparse punctato. Long. 5 mill. Sumatra (coll. Corporaal). — Peut-être var. de *D. lusoria* Ol. Distinct du précédent par le dessous du corps foncé et la coloration du dessus.

O. Corporaali n. sp. Oblongus aut oblongo-elongatus, nitidus, testaceus, tarsis et aliquot antennis apice brunnescentibus, elytris apice breve nigro maculatis. Long. 6-6,5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). —

Voisin par sa forme de *O. lusoria* Ol., mais tout autre par sa coloration.

O. spectabilis v. nov. inapicalis. Capite antice fulvo, elytris rubro-testaceis, immaculatis. Sumatra (coll. Corporaal et Pic).

O. major (nov.). Grandis, elongatus, nitidus, niger, elytris ad basin sat breve rubro-notatis; elytris subcostulatis, antennis depressis. Long. 9 mill. Sumatra (coll. Corporaal). — Très remarquable par sa grande taille, son prothorax rétréci et subtronqué antérieurement, marqué, sur son pourtour, d'une large gouttière. Peut-être variété de *Weyersi* Ol., que je ne connais pas sûrement.

O. ruficeps n. sp. Oblongus, nitidus, niger, capite, thorace, illo nigro lineato, abdomineque apice rufis. Long. 5 mill. ? Indes. — A placer près de *subtilis* Ol.

O. atricolor n. sp. Elongatus, nitidus, niger. Long. 4,5 mill. Indes. — Plus allongé que *impustulata* Pic, avec le prothorax plus fortement relevé sur les bords.

O. subapicalis v. helodiformis mihi. Elytris plus minusve obscuris. Ile Banguey.

O. lateralis n. sp. Minutus, elongatus, nitidus, brunneus, antennis apice, pectore pedibusque testaceis, elytris brunneis, testaceo marginatis. Long. 4 mill. Bornéo. — Espèce très distincte par sa petite taille jointe à sa coloration. Voisin de *debilis* Ol.

O. javana (nov.). Elongatus, parum nitidus, niger, thorace in disco late nigro, elytris nigris, ad basin sat longe testaceis et testaceo marginatis. Long. 7 mill. Java. A placer près de *Weyersi* Ol., dont il n'est peut-être qu'une variété.

Ochotyra obscura n. sp. Parum elongatus, rufo-testaceus, capite et thorace pro majore parte nigris, elytris in disco piceis. Long. 8 mill. Indes. — Plus foncé que *semiusta* Pascoé.

Idgia pallidolimbata n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, palpis, antennis, thorace, scutello femoribusque ad basin testaceis, elytris piceis, pallido limbatis. Long. 7 mill. Sumatra. — A placer près de *suturalis* Kirsh.

Idgia bimaculata n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite antice, palpis, antennis, infra corpore pro parte, coxis tibiisque plus minusve rufo-testaceis, thorace rufo, in disco nigro bimaculato; elytris rufis, apice breve nigro maculatis. Long. 9 mill. Indes Or. — Très distinct par son prothorax maculé.

Laius luteo-notatus n. sp. ♀. Oblongus, nigro-subcyaneus, elytris antice transverse et postice rotundato luteo maculatis, antennis ad basin testaceo notatis, abdomine rubro. Long. 3,5 mill. Sumatra. — A placer près de *diversemaculatus* Pic.

L. pisanganus n. sp. ♀. Elongatus, niger, elytris subviolaceis, capite post oculos rufo notato, antennis et pedibus pro parte rufescentibus. Long. 4 mill. Sumatra. — A placer près de *carinatifrons* Pic.

L. triimpressus n. sp. ♂. Elongatus, niger, elytris subviolaceis, capite ad oculos tuberculato, inter oculos triimpresso. Long. 3,5 mill. Bornéo. — Voisin de *diabolicus* Pic, avec la tête de structure différente.

L. Corporaali n. sp. ♂♀. Oblongus aut parum elongatus, nigro-viridescens. Long. 3-3,5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic. — Diffère de *diabolicus* Pic, par sa coloration verdâtre et par le ♂ ayant une corne

émoussée, arquée en dedans, au lieu d'être saillante et droite.

L. adonis n. sp. Elongatus, subparallelus, niger, coxis, antennis apice et ad basin infra rufis, thorace rufo, abdomine pallido, elytris subviolaceis, ante et post medium albo maculatis; antennis apice attenuatis, articulo tertio depresso, robusto, 4° breve et lato; thorace satis breve, postice paulo attenuato et transverse impresso; elytris minute sat dense punctatis, nigro hirsutis. Long. 4,5 mill. Sumatra (coll. Corporaal). — Jolie espèce, bien distincte par sa coloration.

L. viridithorax n. sp. ♂. Oblongus, niger, capite thoraceque viridescentibus, elytris violaceis, post basin late luteo fasciatis; antennis testaceis, apice nigris, articulo 1° sinuato, extus lunato et dentato, 3° transverso, excavato et lobato. Long. 5 mill. Chine. — A placer près de *Pelegrini* Pic. — La var. *atricollis* mihi, de Shang-Haï, a l'avant-corps noir et la bande des élytres très nettement retrécie sur la suture. Le type est une ♀ ayant le 1er article des antennes long et le 3e peu épais.

Carphurus bipartitus n. sp. Elongatus, niger, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis, elytris nigris, postice late albidis et lateraliter nigro-cinctis; thorace punctato, breve, postice attenuato, antice et postice transverse impresso. Long. 4 mill. Sumatra (coll. Corporaal). — Peut se placer près de *reflexicollis* Pic.

C. Rouyeri v. nov. obscurior. Elytris piceis. Sumatra.

C. atromaculatus v. nov. diversipennis. Elytris testaceis, lateraliter in disco et ad suturam piceo notatis, abdomine apice rufo. Sumatra (coll. Corporaal).

C. rufifrons n. sp. Elongatus, niger, capite antice late rufo, antennis ad basin pedibusque 4 anticis pro majore parte testaceis. Long. 4,5 mill. Formose. — A placer près de *nigrarius* Gorh.

C. madurensis n. sp. Elongatus, piceus, antennis ad basin testaceis, his validis, elytris late brunneis. Long. 3 mill. Madura. — Voisin de *picipennis* Gorh.

Microcarphurus atriventris n. sp. Oblongus, niger, antennis ad basin testaceis; capite antice impresso; thorace parum breve, postice impresso, punctato. Long. 3-3,5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — A placer près de *brunneiventris* Pic.

Homocorhipis maçulaticeps n. sp. ♂. Elongatus, testaceus, capite inter oculos nigro notato et elytris ante apicem minute nigro maculatis. Long. 9 mill. Sumatra. — Plus étroit et de coloration plus claire que *usta* Frm.

Simianus pyrochroides n. sp. ♂. Elongatus, niger, capite pro parte, thorace (illo minute nigro trinotato), scutello, elytris ad basin femoribusque ad basin rufis; thorace antice attenuato, in disco sulcato et lateraliter impresso; elytris costatis, costis postice obliteratis. Long. 12 mill. Sumatra. — Jolie espèce, à faciès de *Pyrochroide*.

Callirrhipis sirambeus n. sp. ♂. Elongatus, niger, pro parte rufescens, holosericeo diverse pubescens, antennis pedibusque rufescentibus; antennis gracilibus, elongatis; thorace breve, lateraliter sinuato, lateraliter postice late impresso; elytris costatis et diverse impressis. Long. 11-12 mill. Sumatra. — Sans doute voisin de *impressicollis* Frm.

C. samoensis n. sp. ♀. Elongatus, fere glaber, rufus, pro parte brunnescens, capite obscuriore; thorace medio

lateraliter foveolato, postice multi-impresso; elytris costatis, ad humeros impressis. Long. 22 mill. Samoa. — A placer près de *borneensis* Pic.

Lichas mediocris n. sp. Elongatus, postice attenuatus, parum convexus, castaneus, luteo et sat regulariter pubescens, antennis pedibusque rufis, thorace distincte marginato. Long. 16 mill. Sumatra. — Moins allongé que *Seillieri* Pic, avec le prothorax plus fortement rebordé.

Bradytoma lineata n. sp. Parum elongatus, niger, capite antice, thorace lateraliter, scutello pedibusque testaceis, elytris nigris, lateraliter testaceo limbatis, in disco et longitudinaliter testaceo lineatis. Long. 7 mill. Cuyaba. — Plus allongé que *aurita* Guer., avec la coloration très différente.

Ichthyurus madurensis n. sp. ♂. Niger, capite inter oculos, thorace, illo in disco transverse nigro-undulato, scutello, elytris apice et infra humeris, pectore et abdomine pro parte pallidis. Long. 13 mill. Madura. — Voisin de *validus* Gestro.

I. binotatus n. sp. ♂. Testaceus, capite postice, oculis, pectore pro parte abdomine apice, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris; thorace in disco nigro binotato. Long. 15 mill. Madura. — Voisin de *immaculatus* Pic.

Discodomorphon n. gen. ♂. Antennis apice modice incrassatis; thorace lateraliter late lunato; unguiculis pro parte fissis. Genre voisin de *Rambesilis* Pic avec le dernier article des antennes non fendu, mais en forme de cuillère ainsi que le précédent.

Discodomorphon inæqualicolle n. sp. Elongatus, piceus, pedibus pro parte brunnescentibus; thorace parum

elongato, antice subarcuato, lateraliter et postice in disco late impresso; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, subparallelis. Long. 7 mill. Sumatra.

Discodon s. g. nov. Cavodiscodon ♂. Articulo octavo antennarum particulare, sinuato et pro parte excavato.

Cavodiscodon bicoloricorne n. sp. Satis elongatus, testaceus, palpis, antennis (his testaceo annulatis), elytris, femoribus apice, tibiis tarsisque pro majore parte nigris; thorace parum elongato, in disco breve brunneo notato. Long. 8 mill. Sumatra. — Ressemble à *D. arcuatipes* Pic, antennes différentes, annelées, tibias moins arqués, etc.

Discodon s. g. nov. Microdiscodon ♂. Articulis intermediis antennarum dilatatis et impressis.

Microdiscodon semicrassicorne n. sp. Elongatus, testaceus, oculis, antennis (articulo primo pro parte testaceo), tibiis, tarsis elytrisque nigris, aliquot humeris rufis; antennis pro parte difformibus ♂, aut filiformibus ♀. Variat: elytris nigris, ad basin late testaceis (v. *bandurense*), aut testaceis et apice nigro notatis (v. *Corporaali*). Long. 7-8 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic.

Discodon piceum n. sp. Minutus, nitidus, subparallelus, piceus; capite lato; thorace breve, lateraliter late lunato; elytris thorace latioribus, rugulosis. Long. 6-7 mill. Java. — Peut se placer près de *curticolle* Pic.

D. griseopilosum n. sp. Elongatus, piceus, griseo pilosus, capite thoraceque pro parte rufis, coxis femoribusque ad basin testaceis; thorace satis breve, medio et lateraliter sulcato; elytris thorace paulo latioribus. Long. 6 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Voisin du précédent.

D. subviridipenne n. sp. Parum elongatus, nitidus, nigro-metallescens, capite antice, antennis (his ad basin nigris) thoraceque testaceis, elytris viridescentibus, abdomine pro parte rufo. Long. 10 mill. Java. — Voisin de *Fruhstorferi* Pic.

D. lahagonum n. sp. Satis elongatus, subparallelus, nigro-metallescens, capite antice, antennis, palpis, thorace, coxis et abdomine pro parte testaceis. Long. 10 mill. Ile Nias. — A placer près de *D. viridanum* Gorh.

D. padangum n. sp. Satis elongatus, testaceus, capite, antennis pro parte supra, scutello, femoribus apice, thorace (sat elongato), tibiis tarsisque nigris, elytris viridi-metallicis. Long. 10 mill. Sumatra. — A placer près de *Rouyeri* Pic.

D. patunuangum. Satis elongatus, testaceus, capite postice, antennis pro majore parte, geniculis tarsisque nigris, elytris obscuris, testaceo marginatis; thorace subquadrato. Long. 9-10 mill. Célèbes. — Voisin de *martapuranum* Pic.

D. brunneonotaticeps n. sp. Angustatus, nitidus, niger, supra testaceus, capite in vertice brunneo maculato; thorace subquadrato, tri impresso; unguibus pro parte fissis. Long. 5 mill. Indes.

D. Modiglianii n. sp. Elongatus, niger, thorace, femoribus ad basin et abdomine pro parte flavis, elytris cæruleo-metallicis. Long. 9 mill. Sumatra: Si Rambé. A placer près de *Fruhstorferi* Pic.

D. Fruhstorferi v. nov. annulare. Femoribus testaceis, apice nigris, tibiis pro parte piceis. Sumatra.

Lycopolemius n. g. Antennis plus minusve compressis aut angulatis; thorace breve, lateraliter plicato; unguibus in mare pro parte fissis.

Ce nouveau genre (à ongles externes bifides au sommet chez ♂ et, par ce caractère, distinct à première vue de *Polemius* Lec.), présente un prothorax particulier, muni d'un repli en dessus latéralement, de façon à former un petit bourrelet plus ou moins brillant. Il comprend les anciens *Polemius Rouyeri* Pic et voisins et les nouveautés suivantes, toutes d'un aspect mat.

L. verticalis ♀. Assez allongé, noir avec une ligne rousse sur le vertex, prothorax large, testacé, avec deux lignes noires, élytres noirs, avec deux courtes lignes basales testacées. Médan.

L. lineatus ♂. Allongé, noir avec une bande antérieure discale pourprée sur les élytres, prothorax à échancrure postérieure sinuée. Palembang.

L. signatus ♀. Assez allongé, noir de poix, élytres avec une longue macule antérieure externe testacée, prothorax linéolé et faiblement bordé de roux, membres en partie roux. Brunei.

L. rufipennis ♂. Allongé, noir, prothorax testacé à 2 lignes noires discales, élytres d'un testacé roussâtre. Pégu.

L. Gorhami ♀. Un peu large, noir en dessous, testacé en dessus, avec la tête ornée de deux lignes noires. Java.

L. javanus ♀. Assez robuste, noir avec la partie postérieure de la tête, le prothorax et le rebord antérieur externe des élytres roux. Tiji-Solak.

Macrosilis apicalis n. sp. Oblongo-elongatus, testaceus, elytris apice viridi notatis, antennis apice et pectore pro parte nigris. Long. 10 mill. Ceylan. — A placer près de *laticollis* Boh.

M. tonkineus n. sp. ♀. Satis elongatus, postice attenuatus, rufo-testaceus, antennis pro parte, tibiis apice, tarsis, pectore pro parte elytrisque nigris. Long. 10 mill. Tonkin. — Voisin de *Fortunei* Pic, mais élytres très resserrés postérieurement et prothorax fortement sillonné.

Mimopolemius n. gen. Antennis plus minusve robustis aut dentatis; thorace obconico, antice arcuato, lateraliter impresso sed non inciso ♂, angulis posticis prominulis; unguibus, non fissis. — A placer près de *Polemius* Lec.

M. albidicoxis n. sp. Elongatus, parum nitidus, testaceus, capite postice, antennis, scutello plus minusve, pectore, abdomine pro parte pedibusque (coxis albidis) nigris, thorace in disco nigro lineato, lateraliter piceo aut brunneo notato, elytris costatis, nigris, antice late testaceo notatis. Aliquot thorace immaculato et scutello rufo (v. nov. *diversicollis*). Long. 8-9 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — A placer près de *C. sordida* Gorh., qui peut rentrer dans ce nouveau genre.

M. (1) **dilaticornis** n. sp. Niger, capite rufo, in vertice brunneo notato, thorace, scutello elytrisque testaceis, his apice sat lato nigro notatis; antennis valde depressis; thorace satis lato. Long. 9 mill. Java. — Distinct, à première vue, du précédent par ses antennes très robustes.

Polemiosilis n. gen. Antennis plus minusve robustis aut dentatis; thorace robusto, antice lateraliter subrotundato, non inciso ♂, angulis posticis plus minusve

(1) Peut rentrer encore dans ce genre, l'ancien *Discodon subarcuatipes* Pic et sa var. nov., de Java : *ingeniculatus*, à élytres plus noirs, moins pubescents et à pattes foncées.

acutis, extus prominulis; unguibus non fissis. — Voisin du genre précédent.

P. obscuricolor n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace pro parte rufo marginato, antennis apice pallidis. Long. 7-8 mill. Bornéo.

P. bipartipennis n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace elytrisque ad basin sat late testaceis, antennis apice flavis. Long. 8 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Voisin du précédent.

P. testaceicollis n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace testaceo, scutello piceo; capite valido; elytris thorace paulo latioribus. Long. 7 mill. Malacca. — Voisin de *S. hamatus* Gorh., qui peut rentrer dans ce nouveau genre.

P. rufosuta n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, capite postice, antennis (his apice flavis), geniculis, tarsis, abdomine apice elytrisque nigris, sutura antice rufo marginata. Long. 8 mill. Célèbes. — Voisin du précédent.

P. tricoloricornis n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, oculis, articulo 2° apice et articulo 3° nigris, aliquot geniculis anticis, antennarum tarsisque pro parte nigris, articulis ultimis antennarum flavis; capite lato; thorace antice arcuato, postice breve strangulato, lateraliter impresso; elytris thorace paulo latioribus. Long. 7-8 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Sans doute voisin de *S. spurcaticornis* Frm., qui me paraît devoir rentrer dans mon nouveau genre.

P. testaceobasalis. Elongatus, nitidus, testaceus, oculis nigris, elytris griseo pubescentibus, obscuris, antice ad humeros testaceo notatis; thorace sat elongato,

antice valde arcuato. Long. 11 mill. Célèbes. — Espèce bien distincte par la forme de son prothorax.

Une autre espèce voisine, de la même provenance, *tolianus* mihi, a le prothorax moins long, les élytres concolores foncés, et les antennes noires à base testacée.

P. apicicornis v. nov. piceoscutellaris. Niger, thorace testaceo, capite antice rufescente, antennis apice breve flavis, scutello piceo. Sumatra.

P. foveolatus n. sp. Elongatus, niger, labro et thorace rufis; thorace antice et lateraliter late foveolato; elytris thorace paulo latioribus; antennis nigris, apice testaceis. Long. 7 mill. Tonkin. — Par sa coloration, voisin du précédent et distinct par la forme de son prothorax.

Fissocantharis n. gen. Antennis satis validis, capite post oculos attenuato; thorace obconico; unguibus fissis. — Par ses ongles fendus, ce genre se rapproche de *Rhagonycha* Esc.

Fissocantharis impressicornis n. sp. Elongatus, opacus, nigro-rufescens, pro parte piceus, elytris nigris, ad basin late testaceo notatis; antennis validis, pro parte impressis. Long. 9 mill. Bornéo.

Fissocantharis opaca n. sp. Elongatus, opacus, niger, capite antice, geniculis et femoribus pro parte testaceis, thorace vage rufo-notato, elytris nigris, ad basin purpureis, costatis. Long. 10 mill. Sumatra. — Diffère du précédent par les antennes plus longues et moins épaisses, les élytres plus longs, à base pourprée, etc.

Rhagonycha diversipennis n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, antennis apice, infra corpore pro parte tarsisque nigris, elytris piceis, ad basin testaceis; thorace subquadrato; unguibus fissis. Long. 6 mill. Yunnan.

Rhagonycha rufula n. sp. Elongatus, nitidus, rufulus, pro parte brunnescens aut testaceus, antennis nigris, articulo 1° infra testaceo; thorace subquadrato; elytris elongatis, parallelis. Long. 5 mill. Malacca. — Voisin du précédent.

Rhagonycha coreana n. sp. Elongatus, postice paulo dilatatus, niger, antennis ad basin rufis; thorace subquadrato. Ile Kelpaert. — Voisin de *Caroli* Pic, avec le prothorax différent, moins large.

Podabrus ruficollis n. sp. Angustatus, nitidus, niger, thorace rufo, illo obconico. Long. 8 mill. Indes Or. — Plus étroit que *pilipes* Pic, avec le prothorax différent, la tête plus foncée, etc.

Silis laosensis n. sp. ♂. Oblongus, nitidus, niger, capite antice, antennis ad basin, thorace, scutello pedibusque pro parte rufis; thorace transverso, postice lateraliter longe et late lobato. Long. 4 mill. Laos.

Silis sanguineus n. sp. Robustus, pubescens, rufus, elytris pallidioribus, antennis nigris, thorace lateraliter valde inciso et bidentato ♂. Long. 8 mill. Madura.

Silis nigrolineatus n. sp. ♀. Latus, nitidus, niger, thorace robusto, rufo, nigro bilineato, capite antice geniculisque rufis. Long. 6 mill. Indes. — A placer près de *thibetanus* Pic.

Cantharis indica Pic 1916 = *indiana* mihi (muté); — *C. subopacipennis* Pic 1916 = *subopaca* (muté); — *C. thibetana* Pic 1916 = *vrianatanga* (muté); — *C. insularis* Fiori (1914) = *europea* (muté).

Cantharis griseohirsuta n. sp. Angustatus, nitidus, sat longe griseo pubescens, testaceus, capite postice, antennis (ad basin rufis), tarsis, elytris, pectore et ab-

domine pro parte nigris; thorace sat elongato, antice paulo attenuato, lateraliter subsinuato; elytris thorace paulo latioribus. Long. 9 mill. Laos. — Peut se placer près de *luteohirsuta* Pic.

C. philippinensis n. sp. Elongatus, subparallelus, flavus, capite postice, antennis, thorace in disco, elytris, infra corpore pro parte, geniculis, tibiis tarsisque nigris. L. 9 mill. Iles Philippines. — A placer près de *semilimbata* Pic.

C. pallidocincta n. sp. Elongatus, nitidus, sat longe griseo pubescens, testaceo-pallidus, capite antennisque piceo-brunneis, elytris nigris, pallido cinctis. Long. 9 mill. Tonkin.

C. obconicicollis v. nov. subelongatipennis. Elytris parum elongatis, thorace nigro, lateraliter rufo notato. Tonkin.

C. nigroverticalis v. nov. trinotatithorax. Capite testaceo, in vertice late nigro; thorace testaceo, in disco transverse nigro trimaculato. Yunnan.

C. malaccana n. sp. Angustatus, opacus, niger, capite pro parte rufescente, thorace rufo; capite robusto; antennis subfiliformibus, sat validis; thorace breve, obconico; elytris thorace paulo latioribus, elongatis. Long. 8 mill. Malacca. — A placer près de *sinensis* Gorh.

C. rufonotaticeps n. sp. Oblongo-elongatus, niger, capite inter oculos rufo notato, thorace rufo, in disco et antice nigro notato, femoribus ad basin et abdomine pro parte rufis, elytris piceo-brunnescentibus, ad basin et lateraliter nigris. Long. 9 mill. Chine. — A placer près de *curtata* Ksw.

C. seximpressa n. sp. Angustatus, nitidus, niger, ar-

ticulo 1° antennarum pro parte, femoribus ad basin abdomineque testaceis, elytris viridi-metallis; thorace quadrato, sex impresso. Long. 6 mill. Indes. — Espèce très distincte par la structure du prothorax.

C. Newtoni n. sp. Elongatus, parum nitidus, luteo sat dense pubescens et hirsutus, niger, abdomine rufo notato; thorace subquadrato, sulcato et late impresso. Long. 8 mill. Sikkim. — Peut se placer près de *semiopaca* Pic.

C. flavonotata n. sp. Oblongus, nitidus ,griseo pubescens, flavus, capite uni et thorace bi nigro maculatis, infra corpore pro parte elytrisque nigris, his ad scutellum flavo-notatis. Long. 6-7 mill. Indes. — Voisin de *bipuncticollis* Gorh.

C. gracilitarsis n. sp. Angustatus, nitidus, niger, thorace et abdomine rubris; thorace elongato, antice attenuato, sulcatulo. Long. 9 mill. Formose. — A placer près de *podabriformis* Pic.

C. silisiformis n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, oculis, antennis ad medium late nigris, elytris nigris, ad basin late testaceis; antennis filiformibus; thorace breve, lateraliter lunato; elytris thorace paulo latioribus. Long. 6 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — A placer près de *ceylonica* Pic.

C. obscuripes n. sp. Elongatus, niger, elytris ad basin late testaceis. Long. 6 mill. Java. — Voisin du précédent, prothorax plus long, pattes foncées, etc.

C. longipilis n. sp. ♂. Elongatus, longe et sparse pilosus, testaceus capite postice antennisque pro majore parte, tibiis tarsisque piceis; antennis filiformibus; capite thorace latioribus, oculis magnis; thorace elongato, lateraliter subarcuato; elytris thorace paulo latioribus, pa-

rallelis, fortiter punctatis. Long. 7 mill. Sumatra (coll. Corporaal). — Espèce à faciès de *Podabrus* et à prothorax de forme particulière.

Sous le nom de v. *subsinuaticollis*, je distingue une ♀ de forme moins allongée, à tête moins large et prothorax plus large, subsinué sur les côtés. Sumatra (coll. Pic).

C. strangulatithorax n. sp. Angustatus, niger, thorace rufo, antice coarctato et transverse fortiter impresso, elytris distincte costatis. Long. 8 mill. Java. — Voisin de *angusticollis* Gorh. *var. rufoscuta* mihi, qui, avec les élytres foncés, a l'écusson roux.

C. angusticollis v. nov. semicastanea. Capite thoraceque plus minusve castaneo-rufis aut pro parte piceis. Sumatra (coll. Corporaal et Pic).

C. baluensis n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, antennis ad basin, thorace pro majore parte, scutello, elytris, his apice nigro notatis, geniculisque testaceis; thorace elongato; elytris thorace latioribus. Long. 6 mill. Kina Balu. — Peut se placer près de *latefulva* Pic, bien distinct par la forme de son prothorax et l'avant-corps mat.

C. granulaticeps mihi, de Bornéo, très voisin, à l'écusson foncé, ainsi que les élytres, le prothorax resserré en avant et fortement sillonné au milieu et offre une variété (v. *unicoloricollis*) à prothorax entièrement foncé.

C. rufovittata n. sp. Satis elongatus, fere opacus, niger, capite infra, thorace postice, elytris ad basin late geniculisque testaceis, thorace in disco rufo bivittato, illo antice strangulato; elytris thorace latioribus. Long. 6 mill. Sumatra. — Voisin du précédent, plus robuste, prothorax plus court, etc.

C. robusticeps n. sp. Elongatus, nitidus, rufescens, elytris testaceis, postice late piceis; capite robusto; thorace elongato, ad medium strangulato; elytris thorace paulo latioribus, parallelis. Long. 6 mill. Preanger. — Espèce caractérisée par sa tête robuste jointe à sa forme allongée, pouvant prendre place près de *infossulata* Pic.

C. bicoloripyga n. sp. Elongatus, subparallelus, testaceus, capite postice, tarsis, pygidio pro parte et elytris apice breve nigris; thorace valido, subtransverso; elytris thorace paulo latioribus. Long. 8 mill. Célèbes. — A placer près de *semilimbata* Pic.

C. salibaboensis n. sp. Parum elongatus, testaceus, elytris nigris; thorace valido, antice arcuato; elytris thorace paulo latioribus, mediocre punctatis, humeris prominulis. Long. 12 mill. Salibaboe. — Voisin du précédent.

Lycocerus Rouyeri n. sp. Robustus, testaceus, palpis, antennis pedibusque pro majore parte elytrisque nigris; thorace breve, antice attenuato, elytris satis latis, opacis, costatis. Long. 13 mill. Sumatra. — Très distinct par ses élytres entièrement foncés.

L. Corporaali n. sp. Robustus, niger, capite in vertice thorace et elytris antice late testaceis. Variat: elytris testaceis (*var. unicolor*) aut nigris (*var. atripennis*). Long. 11-13 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Voisin du précédent.

L. lyciformis n. sp. Parum elongatus, opacus, niger, thorace, scutello et elytris ad basin late purpureo-testaceis, antennis compressis. Long. 12-13 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Très jolie espèce à faciès de *Lycide*.

TABLE

POUR LE TRENTE-TROISIÈME FASCICULE

Page

Nouveautés diverses 1

LES IMPRIMERIES RÉUNIES, MOULINS